


Handsondieren beim Neugeborenen



Liebe Eltern

Gerne leiten wir Sie im Handsondieren Ihres Kindes an. Ihr Kind erhält die Milch entweder über das Stillen, den Schoppen oder die Magensonde. Damit Sie Ihr Kind bei der Nahrungsaufnahme über die Magensonde unterstützen können, möchten wir Sie gerne darin anleiten. Sie können ihrem Kind die Milch über die Magensonde verabreichen. Die Position wird mit der Pflegefachperson besprochen.

1. Schritt

Hände waschen und benötigtes Material vorbereiten.

Je nach Milchmenge wird die Spritzengröße gewählt.



- 1 Aufziehschlauch
- 2 Spritze
- 3 ev. NaCl Spülung

2. Schritt

Mithilfe des Aufziehschlauches die benötigte Milchmenge aufziehen.



Danach Aufziehschlauch entfernen.



3. Schritt

Vor dem Sondieren muss eine Lagekontrolle der Sonde durchgeführt werden (Verantwortung bei der zuständigen Pflegefachperson).

Verschluss der Magensonde öffnen und Spritze durch Drehbewegung aufsetzen.



4. Schritt

Sie können nun Ihrem Kind die Mahlzeit langsam sondieren, Zeitspanne richtet sich nach Milchmenge und Alter des Kindes.

Beobachten Sie Ihr Kind dabei und passen Sie die Geschwindigkeit entsprechend an.



5. Schritt

Nachdem Sie die Milch sondiert haben, wird die geschlossene Magensonde mit NaCl 0.9% gespült (gilt nicht bei offenen Magensonden). Je nach Magensondengröße variiert die Spülflüssigkeitsmenge:

Ernährungssonde Ch4 (Grün): 0.2ml

Ernährungssonde Ch5 (Blau): 0.5ml

Ernährungssonde Ch6 (Gelb): 0.7ml



Inselspital

Universitätsklinik für Kinderheilkunde

Neonatologie

CH-3010 Bern

+41 31 632 14 03

www.kinderklinik.insel.ch

Klinikleiter

PD Dr. med. André Kidszun

Autorinnen:

Miléna Stähli, Debora Prokert, Luzia Reusser, Neonatologie,
April 2022, Version 3_07/23